

Pobieranie materiału do badań parazytologicznych

Pobieranie kału

sprzęt: jałowy pojemnik z łopatką (zakupiony w aptece)

- kał pobrać trzykrotnie, w odstępach 3 – 4 dni
- wskazane jest pobranie kału przed rozpoczęciem kuracji lub 1-3 tygodnie po jej zakończeniu
- pobrać świeży kał przy pomocy łopatki, umieszczonej w pojemniku, w ilości odpowiadającej wielkości orzecha laskowego (z dwóch, trzech różnych miejsc)
- pojemnik szczelnie zamknąć, podpisać imieniem i nazwiskiem, wpisać datę i godzinę pobrania
- kał dostarczyć w dniu pobrania lub przechować do następnego dnia w temperaturze od +2°C do +8°C
- kału nie wolno zamrażać

Pobieranie wymazów okołoodbytniczych - badanie w kierunku obecności jaj owsika

sprzęt: szkiełko podstawowe(otrzymane w laboratorium), przylepiec celofonowy we własnym zakresie

Metoda przylepca celofanowego wg Grahama

- do wykonania wymazu używa się przezroczystego przylepca celofanowego
- pasek przylepca - dł. 5 – 7 cm i szerokości 2 cm, przyłożyć lepką stroną do fałd odbytu, delikatnie przyciskając na całej szerokości, a następnie tą samą stroną przykleić na szkiełku podstawowym
- wymaz pobrać po dwóch godzinach od zaśnięcia dziecka lub rano zaraz po przebudzeniu
- próbkę opisać nazwiskiem, imieniem, datą i godziną pobrania
- próbkę dostarczyć do laboratorium w dniu pobrania