



## **INSTRUKCJE POBIERANIA MATERIAŁU DO BADAŃ PARAZYTOLOGICZNYCH**

### **1. Pobieranie kału**

potrzebne akcesoria: jałowy pojemnik z łopatką (zakupiony w aptece)

- Kał pobiera się trzykrotnie w odstępach 3- lub 4-dniowych.
- Świeży kał należy pobrać przy pomocy łopatki umieszczonej w pojemniku w ilości odpowiadającej wielkości orzecha laskowego (z dwóch lub trzech różnych miejsc).
- Pojemnik należy szczelnie zamknąć, podpisać imieniem i nazwiskiem, wpisać datę i godzinę pobrania.
- Kał należy dostarczyć w dniu pobrania lub przechować do następnego dnia w temperaturze od 2°C do 8°C.
- Kału nie wolno zamrażać.

### **2. Pobieranie wymazów okołoodbytniczych (badanie w kierunku obecności jaj owsika) metodą przylepca celofanowego wg Grahama**

potrzebne akcesoria: szkiełko podstawowe (otrzymane w laboratorium), przylepiec celofanowy (taśma przezroczysta zakupiona przez pacjenta w sklepie papierniczym).

- Do wykonania wymazu używa się przezroczystego przylepca celofanowego.
- Pasek przylepca o długości od 5 do 7 cm i szerokości 2 cm należy przyłożyć lepką stroną do fałd odbytu, delikatnie przyciskając na całej szerokości, a następnie tę samą stroną przykleić na szkiełku podstawowym.
- Wymaz należy pobrać po dwóch godzinach od zaśnięcia dziecka lub rano zaraz po przebudzeniu.
- Próbkę należy opisać nazwiskiem, imieniem, datą i godziną pobrania.
- Próbkę należy dostarczyć do Laboratorium Centralnego w dniu pobrania.