

# ŚWIADOMA ZGODA PACJENTA

## na implantację portu dożylnego

### INFORMACJE DLA PACJENTA

**Dane pacjenta:**

**Imię i Nazwisko:**

**Pesel:**

**Nr Ks. Gł.:**

#### **WIADOMOŚCI OGÓLNE**

Port naczyniowy jest dostępem dożylnym, zakładanym pacjentowi na czas określonej terapii, [zwłaszcza schorzeń onkologicznych], umożliwiającym jej przeprowadzenie. Port pozwala uzyskać stabilny i pewny dostęp naczyniowy, zapewniający możliwość podawania leków [również tych silnie drażniących] oraz nie ogranicza w istotny sposób codziennej aktywności pacjenta. Port zbudowany jest z cewnika założonego do dużego naczynia żylnego oraz komory portu implantowanej pod skórę w specjalnie wypreparowanej 'kieszce' podskórnej. Wykonanie wlewu dożylnego przez port wymaga użycia specjalistycznej igły, przekucia skóry oraz zachowania standardowych warunków jałowych.

#### **WSKAZANIA**

Port dożylny może być zaimplantowany każdemu choremu, który wymaga długotrwałych lub często powtarzanych iniekcji dożylnych, zwłaszcza leków drażniących naczynia krwionośne. Każdy przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie.

#### **PRZECIWWSKAZANIA**

- Brak zgody i/lub współpracy pacjenta
- Uogólniona infekcja
- Zmiany skórne w miejscu przewidywanego wszczepienia portu
- Uogólnione zaburzenia krzepnięcia
- Aktywna zakrzepica żylna w zakresie naczyń przewidzianych do implantacji portu
- Przeciwwskazania względne [indywidualnie]

#### **JAK IMPLANTUJEMY PORT?**

Wszczepienie portu jest zabiegiem planowym. Pacjent powinien być przygotowany do tego zabiegu oraz świadomy jego przebiegu i ewentualnych powikłań. Pacjent powinien spełniać kryteria wskazań i braku przeciwwskazań. Pacjent powinien być na czczo, ale powinien przyjąć leki zażywane przewlekłe [z wyjątkiem leków zaburzających krzepnięcie, a odstawionych przez lekarza prowadzącego w standardowo

przewidywanym okresie]. Przygotowanie do zabiegu obejmuje także depilację miejsca potencjalnej implantacji portu – w tym przypadku prawej [lub lewej] górnej połowy klatki piersiowej.

Najczęściej implantujemy port do prawej żyły szyjnej lub podobojczykowej, zaś właściwa komora portu znajduje się pod skórą na wysokości 3-go żebra.

Port naczyniowy implantowany jest w sterylnych warunkach bloku operacyjnego, w znieczuleniu miejscowym. W trakcie zabiegu pacjent jest monitorowany [stały pomiar ciśnienia tętniczego, akcji serca i saturacji ] oraz w razie potrzeby podawane są dodatkowe leki [ np. leki sedujące, tlen]. Po zabiegu zakłada się jałowy opatrunek. W ciągu godziny wykonuje się zdjęcie radiologiczne, potwierdzające prawidłowe położenie portu. Z portu można korzystać tego samego dnia. Po 7-10 dniach od implantacji należy usunąć szwy . Po zakończeniu terapii port można usunąć, również w znieczuleniu miejscowym.

### **JAKIE MOGĄ BYĆ POWIKŁANIA?**

Ewentualne powikłania zabiegu implantacji portu naczyniowego mogą być typowe dla powikłań kaniulacji żył centralnych oraz znieczulenia miejscowego. Mogą być to:

- Odma opłucnowa, wymagająca kilkudniowego leczenia drenażem opłucnowym
- Nakłucie tętnicy i następowa obecność krwiaka
- Krwaki podskórny w okolicy komory portu

Ewentualne powikłania związane z używaniem portu naczyniowego związane są z możliwością jego zakażenia lub zakrzepicy, wynikającymi najczęściej z nieprawidłowego użytkowania i w każdej sytuacji wymagają konsultacji lekarskiej.

### **JAK NALEŻY POSTĘPOWAĆ Z IMPLANTOWANYM PORTEM NACZYNIOWYM?**

Pacjent posiadający port naczyniowy powinien pamiętać o kilku zasadach:

- Port naczyniowy obsługiwany jest tylko przez wykwalifikowany personel medyczny z zachowaniem zasad aseptyki i profilaktyki powikłań zakrzepowo – zatorowych;
- Skóra nad portem wymaga szczególnej pielęgnacji – z uwagi na częste nakłucia, kontakt ze środkami dezynfekującymi jest ona delikatna i podatna na uszkodzenia; po usunięciu szwów adaptacyjnych nad kieszenią portu i wygojeniu miejsca implantacji należy unikać nadmiernych napięć skóry i tkanek w okolicy portu [również wzdłuż podskórnego przebiegu cewnika naczyniowego]; skórę nad portem można dodatkowo pielęgnować [nawilżanie, natłuszczenie] oraz należy unikać wpływu promieni UV na tę okolicę;
- W sytuacjach szczególnych należy mieć przy sobie kartę identyfikacyjną portu, zawierającą dane pacjenta oraz dane techniczne implantu;

### **Oświadczenie lekarza**

Stwierdzam, że przedstawiłem pacjentowi cel i sposób przeprowadzenia zabiegu, poinformowałem o możliwych zagrożeniach i powikłaniach,. Poinformowałem również pacjenta o możliwych negatywnych konsekwencjach dla zdrowia i życia w przypadku odmowy proponowanej zabiegu.

.....  
pieczęć i podpis lekarza

### **Oświadczenie pacjenta**

1. Zostałem poinformowany/a o rodzaju zabiegu, sposobie jego przeprowadzenia, mogących wystąpić następstwach i powikłaniach oraz o ewentualnej konieczności rozszerzenia zabiegu.
2. Przekazana mi informacja jest dla mnie w pełni zrozumiała.

3. Wyrażam (nie wyrażam)\* zgody na nieplanowe rozszerzenie zabiegu.

\* *niepotrzebne skreśli*

.....

...

data, godzina, podpis pacjenta

**Uwaga:**

W przypadku niemożności wyrażenia pisemnej zgody, za równoważne uważa się wyrażenie zgody ustnie złożone w obecności dwóch świadków.

Zgoda została wyrażona przez pacjenta w formie ustnej w obecności świadków.

.....

data, czytelny podpis świadka

data, czytelny podpis świadka

**Tylko w przypadku odmowy zabiegu**

Po wyczerpującym poinformowaniu mnie nie wyrażam zgody na proponowany zabieg.....

(rodzaj zabiegu)

Zostałam/em poinformowana/y o możliwych negatywnych konsekwencjach wynikających z odmowy wykonania proponowanego zabiegu dla mojego zdrowia i życia z jego narażeniem włącznie.

.....

data, godzina, podpis i pieczęć lekarza

data, godzina czytelny podpis pacjenta