GASTROSKOPIA
PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

1. Przed planowanym badaniem pacjent powinien odwiedzić lekarza rodzinnego, który może zdecydować o zmianie/odstawieniu przyjmowanych leków:

    1) „na krzepliwość” – leki te (np. Aspiryna, Klopidogrel, Tikagrelor, Prasugrel, Acenokumarol, Warfaryna, Rywaroksaban, Dabigatran, Apiksaban, Edoksaban itp.) zwiększają ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego;

    2) „na żołądek” – leki z grupy IPP powinny zostać odstawione na **14 dni** przed gastroskopią.

2. Pacjenci na stałe zażywający leki na nadciśnienie tętnicze, choroby serca i padaczkę mogą przyjąć dawkę leku i popić ją małą ilością wody **do 3 godzin** przed gastroskopią.

3. Jeśli pacjent choruje na cukrzycę, należy to koniecznie zgłosić podczas rejestracji na badanie.

4. Zgodnie z decyzją lekarza przed gastroskopią może zajść potrzeba przyjęcia antybiotyku przez pacjentów:

    1) ze sztucznymi zastawkami serca,
    2) po zapaleniu wsierdzia,
    3) z protezą naczyniową,
    4) z obniżoną liczbą krwinek białych.

5. Aby umożliwić odpowiednie przeprowadzenie badania, należy właściwie opróżnić górny odcinek pokarmowy, stosując się do poniższych zasad:

    1) Ostatni posiłek można zjeść **6 godzin** przed badaniem.
    2) **Na 4 godziny** przed badaniem nie wolno pić, palić papierosów, a nawet żuć gumy.