



TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA Z KONTRASTEM PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

Przed badaniem TK z kontrastem należy:

- poinformować pracownię TK o niewydolności nerek lub nadczynności tarczycy,
- przedstawić w pracowni TK adnotację od lekarza kierującego lub endokrynologa o treści „można podać kontrast dożylnie” u pacjentów z nadczynnością tarczycy,
- dzień przed badaniem wypić w miarę możliwości większą ilość wody niegazowanej (pacjenci dializowani powinni najpierw skonsultować się z lekarzem nefrologiem).

W dniu badania wskazane jest posiadanie:

- dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu),
- aktualnego wyniku poziomu kreatyniny w surowicy krwi (wynik jest ważny przez 7 dni),
- wykonanych wcześniej badań np. TK, angioTK, RTG, USG i ich opisów,
- opisów zabiegów (karty informacyjne leczenia szpitalnego),
- konsultacji specjalistycznych,
- listy aktualnie zażywanych leków,
- jednego litra wody mineralnej niegazowanej.

W dniu badania TK z kontrastem należy:

- ubrać się w wygodny, luźny strój,
- unikać metalowych dodatków, takich jak zamki, guziki, klamry pasków, agrałki itp.,
- zdjąć spinki do włosów, biżuterię, okulary, aparaty słuchowe, niestałe protezy zębowe.
- być na czczo (co najmniej 6 h wcześniej nie należy przyjmować pokarmów stałych, do których zalicza się również mleko),
- przyjmowane na stałe leki zażyć bez zmian (wyjątek: leki zawierające substancję metformina, takie jak METFORMAX, SIOFOR, GLUCOPHAGE, FORMETIC, METRAL, METIFOR, GLUFORMIN należy odstawić na 48 godzin przed przyjęciem na badanie i 48 godzin po badaniu).

Bezpośrednio po badaniu TK z kontrastem:

- pacjent pozostaje pod obserwacją ok. 30 minut,
- wskazane jest spożycie większej niż zwykle ilości płynów.

**CIAŻA JEST BEZWZGLĘDNYM PRZECIWWSKAZANIEM DO WYKONANIA BADANIA
TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ.**