



## TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA Z KONTRASTEM PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

### ZALECENIA:

- Pacjent powinien dostarczyć do pracowni TK skierowanie, na podstawie którego lekarz radiolog zdecyduje o wyborze najlepszego sposobu wykonania badania i wówczas dopiero będzie możliwa rezerwacja konkretnego terminu.
- Skierowanie na badanie jest niezbędne również w przypadku badań komercyjnych.
- Pacjenci z niewydolnością nerek powinni przed zarejestrowaniem skontaktować się z pracownią TK.
- Pacjenci z nadczynnością tarczycy powinni posiadać na skierowaniu adnotację od lekarza kierującego lub endokrynologa: „Można podać kontrast dożylnie”.
- **Pacjent zgłaszający się na badanie TK powinien posiadać aktualny wynik poziomu kreatyniny oraz GFR w surowicy krwi ważny 30 dni. UWAGA, ZMIANA:** proszę koniecznie zapoznać się z informacją dotyczącą badania poziomu kreatyniny (załącznik na dole strony „Kreatynina GFR – przygotowanie do badania”).
- Na badanie pacjent zgłasza się w wyznaczonym terminie.

### Przed badaniem należy:

- wypić dodatkowo ok. 1-2 litrów wody niegazowanej (pacjenci dializowani do decyzji nefrologa),
- na 48 godzin odstawić lek Metformin (Metformax, Siofor, Lucophage, Formetic, Metral, Metifor, Gluformin),
- uzgodnić z lekarzem kierującym lub lekarzem rodzinnym stowienie leków przeciwkrzepliwych (Sintrom, Syncumar, Acenocumarol) oraz zastrzyków podskórnych z heparyny,
- pozostałe leki stosowane na stałe przyjmować bez zmian.

### W dniu badania należy:

- **zgłosić się na czczo** (co najmniej 6h przed badaniem nie należy przyjmować pokarmów stałych, do których zalicza się również mleko. Można wypić niewielkie ilości wody niegazowanej - 1-2 szklanki),
- ubrać się w wygodny, luźny strój,
- unikać metalowych dodatków, takich jak zamki, guziki, klamry pasków, agrałki itp.,
- posiadać do wglądu dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, kartę pobytu),
- przynieść ze sobą wykonane wcześniej badania, np. TK, angio TK, RTG, USG na nośnikach lub kliszach wraz z opisami,
- przynieść ze sobą karty informacyjne leczenia szpitalnego oraz konsultacji specjalistycznych dotyczących badanego obszaru.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli radiolog wykonujący badanie.

### Po badaniu:

- Pacjent pozostaje pod obserwacją personelu Diagnostyki Obrazowej przez ok. 30 minut.
- Przez 1-2 dni wskazane jest spożycie większej niż zwykle ilości płynów.
- Na 48 godzin po badaniu należy odstawić lek Metformin (Metformax, Siofor, Lucophage, Formetic, Metral, Metifor, Gluformin).

**CIĄŻA JEST PRZECIWSKAZANIEM DO WYKONANIA  
BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ.**