

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

Szanowni Państwo, w trosce o należyte przygotowanie do badania prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji i zaleceń.

Aby wykonać badanie należy dostarczyć skierowanie (**koniecznie z kodem jednostki chorobowej**), na podstawie którego lekarz radiolog zdecyduje o wybraniu najlepszego sposobu wykonania badania i wówczas dopiero będzie możliwa rezerwacja konkretnego terminu.

W dniu badania wskazane jest posiadanie dowodu osobistego, dokumentacji medycznej wcześniej wykonanych badań np. TK, RTG, USG (badania na nośnikach lub kliszach) i zabiegów (karty informacyjne), opisów badań tomografii komputerowej, badań ultrasonograficznych, angiograficznych, konsultacji specjalistycznych oraz listę aktualnie zażywanych leków.

W przypadku wykonania badania komercyjnego również wymagane jest skierowanie od lekarza.

Przed badaniem TK należy ubrać się w wygodny, luźny strój, unikać metalowych dodatków takich jak zamki, guziki, klamry pasków, agrałki itp. Zdjąć spinki do włosów, biżuterię, okulary, aparaty słuchowe, niestałe protezy zębowe.

Wszelkich informacji w tej kwestii udzieli osoba wykonująca badanie, ponieważ do każdego rodzaju badania pacjent nie jest tak samo przygotowywany.

Przygotowanie do Tomografii Komputerowej jamy brzusznej lub/i miednicy z kontrastem

- Na badanie należy zgłosić się na czczo (co najmniej 6h wcześniej nie należy przyjmować pokarmów stałych, do których zalicza się również mleko)
- W dniu poprzedzającym badanie unikać pokarmów wzdymających
- Wymagane jest, aby jelita były dokładnie wypróżnione z mas kałowych
- Stosowane na stałe leki powinny być przyjmowane bez zmian.
- 48 godzin przed przyjęciem na badanie i 48 godzin po badaniu należy odstawić lek Metformin (METFORMAX, SIOFOR, GLUCOPHAGE, FORMETIC, METRAL, METIFOR, GLUFORMIN).
- **Dzień przed badaniem wypić dodatkowo ok. 2 litrów wody niegazowanej** (Pacjenci dializowani do decyzji nefrologa).
- Pacjenci z **niewydolnością nerek** lub **nadczynnością tarczycy** mający mieć badanie z kontrastem powinni przed zarejestrowaniem skontaktować się z pracownią TK
Pacjenci z **nadczynnością tarczycy** muszą posiadać na skierowaniu adnotację na skierowaniu od lekarza kierującego lub endokrynologa:
„Można podać kontrast dożylnie”
- Stosowanie leków przeciwkrzepliwych (Sintrom, Syncumar, Acenocumaryl) oraz zastrzyków Heparyny podskórnej – proszę uzgodnić z lekarzem.
- **Pacjent zgłaszający się na badanie TK powinien posiadać aktualny wynik poziomu kreatyniny w surowicy krwi (wynik ważny 7 dni)**
- Proszę przynieść ze sobą ok. 1 litra wody niegazowanej
- Po badaniu wskazane jest spożycie większej niż zwykle ilości płynów
- Po badaniu Pacjent pozostaje pod obserwacją ok. 30 minut

BADANIE TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ PRZECIWSKAZANE JEST W CIĄŻY