

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

Szanowni Państwo, w trosce o należyte przygotowanie do badania prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji i zaleceń.

Aby wykonać badanie należy dostarczyć skierowanie (koniecznie z kodem jednostki chorobowej), na podstawie którego lekarz radiolog zdecyduje o wybraniu najlepszego sposobu wykonania badania i wówczas dopiero będzie możliwa rezerwacja konkretnego terminu.

W dniu badania wskazane jest posiadanie dowodu osobistego, dokumentacji medycznej wcześniej wykonanych badań np. TK, RTG, USG (badania na nośnikach lub kliszach) i zabiegów (karty informacyjne), opisów badań tomografii komputerowej, badań ultrasonograficznych, angiograficznych, konsultacji specjalistycznych oraz listę aktualnie zażywanych leków.

W przypadku wykonania badania komercyjnego również jest wymagane skierowanie od lekarza.

Przed badaniem TK należy ubrać się w wygodny, luźny strój, unikać metalowych dodatków takich jak zamki, guziki, klamry pasków, agrałki itp. Zdjąć spinki do włosów, biżuterię, okulary, aparaty słuchowe, niestałe protezy zębowe.

Wszelkich informacji w tej kwestii udzieli osoba wykonująca badanie, ponieważ do każdego rodzaju badania pacjent nie jest tak samo przygotowywany.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA TK Z KONTRASTEM

- Na badanie należy zgłosić się na czczo (co najmniej 6h wcześniej nie należy przyjmować pokarmów stałych do których zalicza się również mleko).
- Stosowane na stałe leki powinny być przyjmowane zgodnie z zaleceniem lekarza
- 48 godzin przed przyjęciem do badania i 48 godzin po badaniu należy odstawić lek - Metformin (METFORMAX, SIOFOR, GLUCOPHAGE, FORMETIC, METRAL, METIFOR, GLUFORMIN).
- Stosowanie leków przeciwkrzepliwych (Sintrom, Syncumar, Acenocumarol) oraz zastrzyków Heparyny podskórnej – proszę uzgodnić z lekarzem.
- **Dzień przed badaniem wypić w miarę możliwości większą ilość wody niegazowanej** (Pacjenci dializowani do decyzji nefrologa).
- Pacjenci z niewydolnością nerek, lub nadczynnością tarczycy powinni przed zarejestrowaniem skontaktować się z pracownią TK
Pacjenci z nadczynnością tarczycy mający mieć badanie z kontrastem muszą mieć na skierowaniu informację od lekarza kierującego lub endokrynologa:
„Można podać kontrast dożylnie”.
- **Pacjent zgłaszający się na badanie TK powinien posiadać aktualny wynik poziomu kreatyniny w surowicy krwi (wynik ważny 7 dni)**
 - Po badaniu wskazane jest spożycie większej niż zwykle ilości płynów.
 - Po badaniu Pacjent pozostaje pod obserwacją przez ok. 30 min.

BADANIE TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ PRZECIWSKAZANE JEST W CIĄŻY